

OTITE MEDIA CRONICA SEMPLICE

L'otite media cronica è definita "semplice" in presenza di una perforazione timpanica (di lunga data), senza complicanze tra cui il colesteatoma.

La perforazione può interessare qualsiasi porzione della membrana timpanica e può essere di diverse dimensioni. Solo le perforazioni molto piccole possono risolversi spontaneamente con la chiusura della membrana stessa.

Tale quadro si può associare o meno a ipoacusia.

Nei casi in cui la perforazione persiste per più di 3 mesi, può essere indicato l'intervento di miringoplastica.
Fig 1



Fig.1 Esempi di perforazione timpanica.

Miringoplastica

La miringoplastica è la ricostruzione chirurgica della membrana timpanica utilizzando generalmente come materiale la fascia del muscolo temporale del paziente. In alternativa, oppure oltre alla fascia, si preleva la cartilagine da parti dell'orecchio (conca/trago).

Può essere eseguita mediante l'accesso chirurgico retroauricolare oppure attraverso il condotto uditivo esterno. Le tecniche chirurgiche e l'accesso dipendono dal tipo di perforazione e dalla sede; la percentuale di successo è superiore al 90%, il rischio di riperforazione nell'immediato post-operatorio o a distanza di mesi è intorno al 10-12%.

L'intervento viene eseguito in anestesia generale, in regime di ricovero ordinario (una notte di degenza) oppure in regime di Day-Surgery (dimissione in giornata).

Il primo controllo ambulatoriale post-operatorio viene eseguito a distanza di circa 20 giorni dall'intervento.